

neo-angin®

brez sladkorja z okusom žajblja

1,20 mg/0,60 mg/5,90 mg pastile

2,4-diklorobenzilalkohol/amilmetakrezol/levomentol

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v **3 – 4 dneh**, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja
3. Kako jemati zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja je antiseptik in blag analgetik za usta in žrelo.

Odrasli, mladostniki in otroci, starejši od 6 let lahko uporabljajo zdravilo za zgodnje lokalno zdravljenje blagih okužb ust in žrela, s čimer se lahko zmanjša tudi poraba antibiotikov. Te okužbe povzročijo vnetja ustne votline in žrela s simptomi, kot so bolečine v žrelu in hripavost, vnetja ustne sluznice in vnetja dlesni.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 – 4 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti preden boste vzeli zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja

Ne jemljite zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja

- če ste alergični na 2,4-diklorobenzilalkohol, amilmetakrezol, levomentol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Posvetujte se z zdravnikom, če kar koli izmed spodaj navedenega velja za vas:

- če se vaše težave po 3 – 4 dnevnem jemanju zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja ne izboljšajo ali se celo poslabšajo;
- če imate dolgotrajen (kronični) kašelj ali hripavost. Omenjena simptoma sta lahko posledica morebitnih malignih obolenj.

Otroci

Zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja ne dajajte otrokom, mlajšim od 6 let.

Druga zdravila in zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja

Ni znano, da bi zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja vplivalo na delovanje drugih zdravil. Priporočamo, da hkrati ne jemljete drugih zdravil za oralno uporabo, to je za uporabo v ustni votlini in žrelu.

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja skupaj s hrano in pijačo

Na voljo ni podatkov, ki bi dokazovali, da hrana ali pijača vplivata na delovanje zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja. Neposredno po jemanju zdravila ne uživajte hrane ali pijače, da le-ta ne bi pospešila odstranjevanja zdravila z ustne sluznice in žrela.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Podatkov o uporabi zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja pri nosečnicah ni oziroma so omejeni. Študije na živalih niso pokazale neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na sposobnost razmnoževanja.

Ker ni dovolj podatkov, tveganja za plod ni mogoče povsem izključiti, zato uporaba tega zdravila med nosečnostjo in dojenjem ni priporočljiva.

Študije za oceno vpliva na plodnost niso bile izvedene.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja strojev, vendar ni pričakovati, da bo vplivalo na te sposobnosti.

Zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja vsebuje barvilo rdeče 4R (E124) in izomalt (E953)

- To zdravilo vsebuje barvilo rdeče 4R (E124), ki lahko povzroči alergijske reakcije.
- Ena pastila zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja vsebuje 2,58 g nadomestka sladkorja izomalta (E953) kar ustreza 6 kcal (26 kJ). To morajo upoštevati bolniki s sladkorno boleznijo (diabetes mellitus). Če vam je zdravnik povedal, da imate





intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom. Izomalt lahko deluje blago odvajalno.

3. Kako jemati zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Navodila za pravilno uporabo

Zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja je namenjeno za uporabo v ustih in žrelu (oralna uporaba). Odrasli, mladostniki in otroci, starejši od 6 let, počasi raztopite v ustih po eno pastilo, na vsake 2 do 3 ure.

Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil. Če se simptomi v 3–4 dneh ne izboljšajo ali se celo poslabšajo, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja, kot bi smeli

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila, se v primeru neželenih učinkov posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zaenkrat ni znanih primerov prevelikega odmerjanja tega zdravila. Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil. Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, je možno, da se bo pojavilo draženje ustne ali želodčne sluznice.

Če ste pozabili vzeti zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Poročali so o naslednjih neželenih učinkih:

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- draženje ustne in želodčne sluznice, kot sta dispepsija, občutek siljenja na bruhanje

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- alergijske reakcije, kot so oteklost ust, jezika in ustnic, izpuščaj

Če se pojavi alergijska reakcija, prenehajte jemati pastile in se nemudoma posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu, poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte tega zdravila, če opazite, da so se pastile raztopile.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjске odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Takı okrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja

Učinkovine so:

2,4-diklorobenzilalkohol	1,20 mg
amilmetakrezol	0,60 mg
levomentol	5,90 mg

Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so: eterično olje poprove mete, izomalt (E953), vinska kislina, eterično olje žajblja, rdeče 4R (E124), kinolinsko rumeno (E104), patentno modro V (E131).

Izgled zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja in vsebina pakiranja

Zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja je v obliki pastil. Pastile so barve medu, okrogle in rahlo prosojne. Zdravilo neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja je na voljo v škatlah z 12 ali s 24 pastilami (dva pretisna omota s po 12 pastil).

Način izdaje zdravila neo-angin® brez sladkorja z okusom žajblja

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

DIVAPHARMA GmbH, Motzener Straße 41, D-12277 Berlin, Nemčija

Proizvajalec

Klosterfrau Berlin GmbH, Motzener Straße 41, 12277 Berlin, Nemčija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 11.06.2025