

Navodila za uporabo  
Natančno preberite to navodilo.

# **junior-angini**<sup>®</sup>

## **pastile za grlo**

---

### **za otroke, z okusom jagode**

Pri bolečinah v grlu obdajo sluznico ust in žrela z zaščitno oblogo.

#### **1. Kaj so pastile za grlo junior-angini<sup>®</sup> in za kaj se uporabljajo?**

Pastile za grlo junior-angini<sup>®</sup> so medicinski pripomoček, ki ščiti sluznico ust in žrela, zlasti pri bolečinah v grlu.

Pri raztapljanju pastile v ustih, tvori islandski lišaj zeliščno oblogo, ki ščiti sluznico ust in žrela. Z raztapljanjem pastile v ustih se učinkovine enakomerno porazdelijo po sluznici ust in žrela.

Drugi sestavini, kot sta npr. cink in pantotenat, negujeta in ščitita sluznico.

#### **2. Kakšna je sestava pastil za grlo junior-angini<sup>®</sup>?**

Ena pastila junior-angini<sup>®</sup> vsebuje:

suh ekstrakt islandskega lišaja, kalcijev pantotenat, cinkov glukonat, saharozo, glukozni sirup, vinsko kislino, aromo jagod in koncentrate (jabolko, črni ribez, redkev).

#### **3. Kako se uporabljajo pastile junior-angini<sup>®</sup> in kako so pakirane?**

Pastile za grlo junior-angini<sup>®</sup> je treba raztopiti v ustih.

Ena škatla vsebuje 24 pastil za grlo junior-angini<sup>®</sup>.

Pri uporabi pastil za grlo junior-angini<sup>®</sup> natančno upoštevajte ta navodila. Če ste glede česar koli negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Odrasli in otroci, starejši od 4 let, naj po potrebi raztopijo v ustih eno pastilo junior-angini<sup>®</sup> vsake 2-3 ure, največ 3 pastile na dan. Sme se jih dajati le otrokom, starejšim od 4 let, ki lahko varno ližejo pastile.

Če bolečine v grlu trajajo več kot 2-3 dni, se posvetujte z zdravnikom.

#### **4. Kdaj se ne sme jemati pastil za grlo junior-angini<sup>®</sup>?**

Ne uporabljajte pastil za grlo junior-angini<sup>®</sup>, če ste preobčutljivi na katero koli sestavino v pastilah.





**5. Kdaj morate biti posebej pozorni pri jemanju pastil za grlo junior-angini®?**

Če pastile jemljete v skladu s tem navodilom, posebni previdnostni ukrepi niso potrebni. Če ste bolni, imate alergijo ali jemljete zdravila (tudi taka, ki se izdajajo brez recepta), se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

**6. Kdaj poteče rok uporabnosti pastilam za grlo junior-angini®?**



Datum izteka roka uporabnosti **pastil za grlo junior-angini®** je odtisnjen na embalaži. **Pastil za grlo junior-angini®** ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti.

**7. Na kaj morate biti še pozorni?**

**Pastile za grlo junior-angini®** shranjujte nedosegljivo otrokom.

Datum revizije navodila: avgust 2014.

**Medicinski pripomoček je na voljo le v lekarnah.**



MPC INTERNATIONAL S.A.  
26, Boulevard Royal  
L-2449 LUKSEMBURG  
LUKSEMBURG

**Distribuirna:**

M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, 50670 Köln, Nemčija  
Član skupine Klosterfrau Healthcare Group

